



Diputació
Barcelona

Xarxa de Parcs Naturals

Montnegre i el Corredor

PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LES
POBLACIONS DE SENGLAR A CATALUNYA

TEMPORADA 2024-2025

Informe per a les colles participants



PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DE SENGLAR A CATALUNYA MONTNEGRE I EL CORREDOR – TEMPORADA 2024-2025

Entitats promotores del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya:

- Diputació de Barcelona – Servei de Gestió de Parcs Naturals
- Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Coordinació del seguiment al Montnegre i el Corredor:

Berta Capella. Tècnica del Servei de Gestió de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona.

Amb la col·laboració dels guardes i resta de personal de la Xarxa de Parcs Naturals que han participat en la recollida de dades i la interlocució amb els caçadors.

Anotació de dades de les batudes als Carnets de colla senglanaire:

Colles senglanaire d'Arenys de Munt, Calella – Sant Pol, Fogars de la Selva, Joan Buch (Pineda de Mar), Llinars, el Rector (SC el Faisà), St. Cebrià-Calella, St. Celoni, St. Iscle de Vallalta, St. Llop (Dosrius-Canyamars), Tordera, Vallgorguina i Vilalba-Sasserra.

Autors de la memòria:

Joana Colomer, Carme Rosell, Ferran Navàs, Ferran Martínez i Sergi Cano
amb la col·laboració d'Anna Colomer.

MINUARTIA

Setembre de 2025

ÍNDEX

1. EL PROGRAMA DE SEGUIMENT DE SENGLAR A CATALUNYA.....	1
2. COLLES PARTICIPANTS I ESFORÇ DE CAÇA AL MONTNEGRE I EL CORREDOR	3
3. NOMBRE DE CAPTURES I DENSITAT DE SENGLAR	5
4. CARACTERÍSTIQUES DELS SENGLARS CAÇATS	9
5. OBSERVACIONS DE CABIROLS I ALTRES UNGULATS A LES BATUDES	9
6. RESUM D'INDICADORS I RECOMANACIONS	13

1. EL PROGRAMA DE SEGUIMENT DE SENGLAR A CATALUNYA

El Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya es va iniciar la temporada 1998-1999, fa **27 anys**, seguint el model implantat a la Zona Volcànica de la Garrotxa vuit anys abans. Actualment integra **23 observatoris** (Figura 1).


El Parc del Montnegre i el Corredor s'incorporà al Programa fa **24 anys**, la temporada 2001-2002.

En cada observatori s'hi analitza l'evolució de les poblacions de senglar a partir de dades individualitzades de totes les batudes fetes durant el període hàbil de caça. El seguiment és possible gràcies a la col·laboració de colles de caçadors d'arreu del país, que faciliten les dades necessàries. En tots els espais s'aplica la mateixa metodologia. Així es disposa d'un registre comparable de l'evolució de les poblacions de senglar –i de la seva caça– i es poden definir les mesures de gestió més adequades a cada situació. La descripció de mètodes i els resultats globals del Programa es poden consultar a l'informe anual que es troba a la web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i a la web www.senglar.cat.

L'augment de les poblacions de senglar a Catalunya, com arreu d'Europa, justifica la necessitat de disposar d'un seguiment acurat i a llarg termini en llocs representatius de diferents paisatges del país. Actualment, **l'objectiu de gestió de senglar es centra en aconseguir controlar la seva expansió i els danys que comporta** a l'agricultura, accidents en carreteres i presència en zones urbanes, entre altres. En el context de la prevenció de la Pesta Porcina Africana, la Comissió Europea també ha recomanat aplicar mesures per controlar les poblacions de senglar a Europa.


La cooperació de caçadors, tècnics i administracions en el marc del Programa de seguiment de senglar és clau per poder definir i aplicar les millors pràctiques de gestió d'aquesta espècie.

Espais del Programa de seguiment de senglar



La Figura 2 mostra l'evolució en les captures de senglar a Catalunya segons la memòria anual d'activitats cinegètiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En aquesta memòria s'inclouen les captures realitzades durant el període hàbil en Àrees Privades de Caça, Reserves Nacionals de Caça i Zones de Caça Controlada, així com les captures efectuades a l'estiu i notificades mitjançant el formulari web de comunicacions de caceres per danys a l'agricultura.

El nombre de senglars caçats a Catalunya la temporada 2024-2025 ha disminuït un 10% respecte la temporada anterior, però cal tenir en compte que són dades parcials, corresponents al 94% dels terrenys cinegètics (les dades per demarcacions no estan disponibles encara per a aquest període; al gràfic es faciliten les de les temporades anteriors a 2023).



La col·laboració de les colles senglanaires en l'anotació de les dades és essencial per portar a terme el seguiment. La seva constància en la participació dona una gran fiabilitat als resultats obtinguts.

2. COLLES PARTICIPANTS I ESFORÇ DE CAÇA AL MONTNEGRE I EL CORREDOR

A la temporada 2024-2025 **han participat en el seguiment 13 colles de caçadors** omplint els quaderns de batudes (Taula 1), dues més que en la temporada anterior.

Taula 1. Colles participants al Montnegre i el Corredor durant la temporada 2024-2025.

Arenys de Munt	Llinars	Tordera
El Rector (SC El Faisà)	Sant Celoni	Vallgorguina
Fogars de la Selva	Sant Iscle de Vallalta	Vilalba Sasserra
Joan Buch (Pineda de Mar)	St Cebrià i Calella	Calella-Sant Pol
Sant Llop (Dosrius-Canyamars)		

La Taula 2 mostra una síntesi de les dades referents a l'activitat cinegètica. L'evolució de les batudes per superfície i del nombre de caçadors participants en cada cacera al Montnegre i el Corredor es mostren a les Figures 3 i 4. La Figura 5 mostra la distribució mensual de les batudes al llarg de la present temporada.

Amb l'objectiu d'estandarditzar el sistema de càlcul i que els indicadors de seguiment siguin comparables amb altres temporades i zones, s'analitzen només les batudes fetes durant el període hàbil.

Taula 2. Superfície cinegètica i esforç de caça al Montnegre i el Corredor en la temporada 2024-2025.

Superfície de terrenys cinegètics	33.598 ha
Àrees cinegètiques	16 APC
Període hàbil de caça	1-set-2024 a 30-mar-2025 (ACC/923/2024, de 21 de març)
Total de batudes anotades	539
Batudes per superfície	1,6 batudes/km ²
Batudes per colla	41 batudes/colla
Mitjana de caçadors participants en cada batuda	19 (mín. 5 - màx. 52)
Mitjana de gossos utilitzats en cada batuda	20 (mín. 2 - màx. 80)

Evolució de les batudes per unitat de superfície




Figura 3. Evolució del nombre de batudes per km² al Montnegre i el Corredor.

1,6

Batudes/km²

La pressió de caça disminueix respecte la temporada anterior.

Evolució de la participació en les batudes




Figura 4. Evolució del nombre de caçadors per batuda al Montnegre i el Corredor.

19

Caçadors/batuda

La participació disminueix lleugerament respecte la temporada anterior.

Distribució mensual del nombre de batudes

Temporada 2024-2025




Figura 5. Batudes mensuals realitzades al Montnegre i el Corredor la temporada 2024-2025.

77


Batudes/mes
(setembre-març)

L'activitat cinegètica és similar entre els mesos de setembre i gener, amb el màxim al desembre, i mostra una disminució en el nombre de batudes al febrer i, sobretot, al març.

3. NOMBRE DE CAPTURES I DENSITAT DE SENGLAR

3.1 Senglars caçats en relació a la superfície de terrenys cinegètics i efectivitat de caça

Durant la temporada 2024-2025, a l'espai **Montnegre-Corredor s'han caçat 1.024 senglars**, una mitjana d'1,9 senglars caçats per batuda i **3 senglars/km² de terrenys cinegètics**. (Figura 6). S'han caçat de mitjana el 37% dels senglars observats a les batudes, efectivitat de caça superior a la mitjana dels darrers cinc anys de seguiment que és del 33%.



3.2 Densitat de la població de senglar

L'estima de densitat és de **9,2 individus/km²** (Figura 7), la quarta densitat més elevada enguany de tots els observatoris on es porta a terme el seguiment de senglar (veure Figura 8).

Segons l'indicador de densitat, que considera el nombre de captures en relació a les batudes realitzades i la superfície de terrenys cinegètics, **la densitat de senglar ha disminuït un 10% respecte la temporada anterior** (Taula 4).


Les densitats de senglar enregistrades a Catalunya en el període d'estudi han estat:

- **Altes, o molt altes**, entre 9 i 15 individus/km² als observatoris del NE de Catalunya, a l'Alt Empordà, Guilleries-Savassona, Zona Volcànica de la Garrotxa, Montnegre i el Corredor i Montseny.
- **Intermèdies**, d'entre 6 i 7 individus/km², als observatoris de Castell de Montesquiú, Serralada Litoral i Marina, Garraf-Olèrdola-Foix, Freser-Setcases i Muntanyes de Prades i d'entre 3 i 6 individus/km² als observatoris de Solsonès-Berguedà, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, ZCC de Collserola, Alta Ribagorça, Montsant i Alt Pallars.
- **Baixes**, inferiors 3 individus/km² als observatoris de Boumort, Cadí, i Ports de Tortosa i Beseit.


Com es habitual, les densitats més altes s'observen en zones amb una gran oferta d'aliment, afavorida per l'elevada pluviometria i l'existència de grans superfícies de boscos productors de fruits forestals (alzines, roures, castanyers i faigs), a les quals s'afegeix possibilitat d'obtenir aliment en conreus de regadiu. En l'extrem contrari, les densitats de senglar més baixes es registren en àrees on les condicions d'hàbitat o la climatologia són menys favorables, com ara espais amb major aridesa i amb major cobertura de brolles, coníferes i secans.

Globalment, pel conjunt d'observatoris, la densitat de senglar a Catalunya ha augmentat, amb un increment mitjà de l'11%. Aquest increment contrasta amb els descensos registrats durant les temporades anteriors arran dels forts episodis de sequera dels anys 2022 i 2023. Enguany, la major part dels observatoris de seguiment mostren increments de densitat d'entre el 12% i el 53%, destacant Sant Llorenç del Munt, l'Alta Ribagorça, Ports de Tortosa Beseit i Garraf-Olèrdola-Foix com els espais amb majors increments. Només 4 observatoris han registrat una disminució de densitat: l'Alt Pallars, Boumort, la ZCC de Collserola i el Montnegre-Corredor.

Les principals causes de les variacions de densitat són factors locals, com la pressió de caça, la disponibilitat d'aliment i les condicions meteorològiques, especialment la pluviometria durant la primavera. Una disponibilitat moderada de fruits forestals, juntament amb augment de les precipitacions durant el 2024, especialment a la primavera, expliquen l'increment de densitat de senglar a bona part dels observatoris de Catalunya.



Estima de densitat de senglar a la xarxa d'observatoris del Programa de seguiment



3.3 Dades complementàries sobre mortalitat de senglar i altres ungulats

Tot i que l'anàlisi de dades del seguiment es centra en les batudes realitzades durant el període hàbil de caça, als quaderns de batudes les colles també anoten les que es porten a terme per reduir danys a l'agricultura durant l'estiu o amb autorització excepcional.

Enguany s'han anotat un total **d'11 caceres realitzades fora del període de caça**, en les quals s'han abatut 25 senglars. Si es sumen a les del període hàbil, s'obté un total de 550 batudes (el 2% fora del període hàbil), i de 1.049 senglars caçats (el 2,4% fora del període hàbil). El rendiment en batudes extraordinàries és de 2,3 senglars caçats/batuda.

No s'han registrat captures de senglars amb altres mètodes diferents de la batuda. Tampoc s'han recopilat dades de senglars, o altres ungulats, morts per causes diferents de la caça.

Recordeu d'anotar a les fitxes del final dels quaderns totes les dades de senglars, cabirols o altres ungulats que es trobin morts, sigui atropellats, ofegats o per causa desconeguda.

Important

Degut a l'alerta per Pesta Porcina Africana a Europa (cap cas a Catalunya)

Si trobeu un senglar mort per causa desconeguda, no el toqueu i aviseu a


Agents Rurals – Tel 93 561 70 00

4. CARACTERÍSTIQUES DELS SENGLARS CAÇATS

4.1 Sexe i pes

Com és habitual en aquest espai, s'ha caçat un nombre superior de femelles que de mascles (Figura 9). La ràtio entre el nombre de mascles i de femelles caçats enguany és de 0,81:1, amb **455 mascles i 565 femelles**. **S'observen diferències estadísticament significatives** respecte la proporció esperada de captures d'ambdós sexes, que és d'un mascle per cada femella.

En conjunt, el 52% dels senglars caçats pesaven menys de 50 kg i el 18% superaven els 70 kg. S'han caçat 4 individus, tots ells mascles, d'un pes igual o superior als 100 kg. **L'individu de mes pes caçat enguany ha estat un mascle de 138 kg.**



4.2 Observacions de porcs vietnamites i senglars encreuats

En alguns espais de la xarxa d'observatoris del Programa de seguiment de senglar s'enregistren porcs vietnamites i/o senglars encreuats amb porcs domèstics (vietnamites o d'altres races). Aquesta temporada, al Montnegre i el Corredor, no s'han observat porcs vietnamites ni senglars creuats durant les batudes.

L'encreuament amb porcs no és gens desitjable, ja que contribueix a augmentar la productivitat de les poblacions de senglar i agreujar els problemes. **La Resolució de Vedes autoritza als caçadors a capturar porcs domèstics ensalvatgits i individus encreuats amb senglar** (amb clapes al pelatge o altres característiques que ho evidencien). És important capturar-los el més aviat possible i anotar la seva captura o observació als quaderns de batudes.



Des de l'any 2019 el porc vietnamita està inclòs al 'Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores' i per tant en queda prohibida la seva possessió, transport, tràfic o comerç d'exemplars vius, i s'estableixen una sèrie de controls per a la seva tinença. Les persones que tenen porc vietnamites com a mascota, granges o nuclis zoològics han de complir la normativa, evitar el seu alliberament a la natura i evitar, amb un tancament efectiu, que puguin entrar en contacte amb senglars.

5. OBSERVACIONS DE CABIROLS I ALTRES UNGULATS A LES BATUDES

Aquesta temporada s'ha observat cabirol (*Capreolus capreolus*) en 432 batudes (Taula 3 i Figura 10).

Les captures de cabirol a les batudes s'anoten des de la temporada 2001-2002 i aquesta temporada s'han caçat 265 cabirols (Figura 11). Aquestes dades no inclouen els que s'hagin caçat durant la primavera i estiu quan només es permet la caça de mascles.

El pes dels cabirols caçats es situa entre els 10 i els 30 kg i el 64% són femelles.



Taula 3. Altres ungulats detectats a les batudes de senglar al Montnegre i el Corredor durant la temporada 2024-2025.

Espècie	Batudes amb observacions		Mitjana d'individus observats per batuda ³
	Nombre	Percentatge ¹	
Cabirol	432	80% ²	3,8

¹ Percentatge respecte el nombre total de batudes anotades als quaderns.

² S'han exclòs les colles que no apunten els avisaments de cabirols.

³ Mitjana calculada tenint en compte només aquelles batudes on s'han realitzat observacions de l'espècie.

6. RESUM D'INDICADORS I RECOMANACIONS

El Montnegre i el Corredor mostra la quarta densitat de senglar més elevada del conjunt d'observatoris inclosos al Programa de seguiment (Taula 4, indicadors de seguiment), i manté una clara tendència a l'alça. Enguany, la densitat de senglar es redueix lleugerament respecte la temporada anterior, a diferència de gran part dels observatoris on augmenta, a causa en gran part, de l'augment de pluviometria i disponibilitat d'aliment. La pressió de caça (batudes per superfície) es redueix també respecte la darrera temporada.

Taula 4. Resultats dels indicadors de seguiment obtinguts al Montnegre i el Corredor, i el valor global dels observatoris del Programa de seguiment de senglar a Catalunya per a la temporada 2024-2025.

		Montnegre i el Corredor	Global observatoris PSS ¹
RW RActivitat cinegètica	1. Batudes realitzades per unitat de superfície (km ²)	1,6	0,9
	2. Caçadors participants a les batudes	19	21
	3. Gossos participants a les batudes	20	25
	4. Efectivitat de caça: proporció dels senglars caçats en relació al total d'observats	37%	42%
Senglars capturats	5. Senglars caçats per batuda	1,9	3,1
	6. Senglars caçats per unitat de superfície (km ²)	3	2,6
Densitat de població	7. Variació índex de densitat relativa respecte temporada anterior	-10%	11%
	8. Estima de densitat de senglar (individus /km ²)	9,2	Mitjana: 6,4 Mín.: 2,7 (Boumort) Màx.: 14,7 (Alt Empordà)
Sexe i pes dels senglars capturats	9. Proporció de sexes (M:F) de senglars caçats	0,81:1	0,94:1
	10. Distribució de pesos: % de femelles que superen els 30kg (efectiu reproductor)	73%	70%

¹Dades provisionals, pendent de rebre informació de quatre espais.

Les recomanacions per a temporada 2025-2026 són les següents:

- **Cal seguir aplicant mesures per reduir -o estabilitzar- la densitat de senglar**, mantenint la pressió de caça, augmentant l'efectivitat de les batudes i aplicant altres mesures on sigui necessari.
- **Durant el 2025 és previsible que les poblacions de senglar mostrin augments importants a la major part del territori.** Aquest increment es deu a l'alta pluviositat registrada durant la primavera i estiu d'aquest any. Aquestes condicions s'ha combinat amb una bona anyada de fruits forestals durant la tardor de 2024, que ha afavorit un major engreixament de les femelles i, en conseqüència, un augment de la productivitat. La col·laboració dels caçadors és un factor clau pel control d'aquesta espècie que no té predadors naturals (el llop té efectius massa escassos per controlar tants senglars).
- **La reducció de l'excés de densitat és necessària per controlar els notables problemes que genera el senglar**, especialment els derivats dels accidents a les carreteres i dels danys als conreus, que generen importants impactes econòmics i conflictivitat social.
- **L'alta densitat també comporta riscos sanitaris. Per prevenir la Pesta Porcina Africana la Comissió Europea ha recomanat aplicar estratègies per controlar les poblacions de senglar.** Actualment la PPA afecta 13 països europeus, amb nous brots recents a Alemanya, Itàlia i Croàcia i s'ha aconseguit erradicar a Bèlgica i Suècia. A Catalunya cal estar alerta per detectar si aparegués algun cas. **Si es troba algun senglar mort sense causa aparent, no el toqueu i truqueu el més ràpid possible a Agents Rurals.** Igualment, cal aplicar bones pràctiques en la manipulació de la carn de caça, ja que augmenten els casos de triquinel·losi, tuberculosi i altres malalties.
- **No doneu menjar als senglars, sota cap circumstància.** Està prohibit i a més, la concentració de senglars als llocs on se'ls aporta aliment afavoreix la transmissió de malalties.
- **Per prevenir danys de senglar recordeu que està disponible la [Guia de Mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge](#)** on hi ha informació sobre les mesures que es poden aplicar en diferents situacions.
- Per a més informació consulteu la resolució *ARP/3127/2025, de 7 d'agost*, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2025-2026 en tot el territori de Catalunya i recordeu:
 - El període hàbil per a la caça del porc senglar és el comprès entre el primer diumenge de setembre de 2025 (dia 7) i l'últim diumenge de març de 2026 (dia 29), ambdós inclosos.
 - **La caça del porc vietnamita ensalvatgit i els híbrids d'aquests amb senglar està autoritzada**, tant durant les batudes en període hàbil com en l'exercici de les autoritzacions excepcionals per danys. Des del 2019 aquesta espècie està inclosa al 'Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores' i per tant en queda prohibida la seva possessió.

Totes les dades del Programa de Seguiment de Senglar a Catalunya, així com altra informació rellevant sobre l'espècie, la trobareu a la nova web: www.senglar.cat

Moltes gràcies un any més per la vostra col·laboració, i bona cacera.